


# FÆRRE BID MED BAYVANTIC® VET.

I SKOVEN, HAVEN OG DERHJEMME.

## BRUGSVEJLEDNING



På hunde, der vejer under 10 kg, udtømmes pipettens indhold mellem hundens skulderblade. Hunde, der vejer mere end 10 kg, skal have pipettens indhold fordelt 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod.



Skil hårene i nakken på hunden på hvert påføringssted, så huden bliver synlig. Placer pipettens åbning på huden og tøm forsigtigt hele indholdet direkte ud på huden. På større hunde (25-40 kg) er det nødvendigt at dele pipettens indhold på op til 4 påføringssteder. På den måde fordeles produktet bedst muligt.



Kontroller at pipetten er helt tom efter endt behandling.

- Kan anvendes til diegivende og drægtige hunde
- Minimum alder og vægt: 7 uger og 1,5 kg



Dræber og holder flåter på afstand  
Dræber lopper og forebygger loppeangreb  
Holder myg, sand- og staldfluer på afstand  
Beskytter dit hjem mod lopper



Du får 4 pipetter pr. pakke



## Bayvantic® Vet. fås på apoteket, hos dyrlægen og dyrehandlere

**Bayvantic® Vet. spot-on**, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin).  
**Indikation:** Til behandling og forebyggelse af loppe- og flåtangreb på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Desuden har Bayvantic® vet. en repellerende („anti-blodsugende“) virkning på flåter, myg, sandfluer og staldfluer. Herved hindres de repellerede parasitter i at suge blod, og risikoen for overførsel af visse sygdomme nedsættes (f.eks. Borreliosis, Rickettsiosis, Ehrlichiosis og Leishmaniasis). Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit.

**Administrationsmåde:** Kun til brug på huden. **Dosering hund:** 1,5-4 kg: 1 pipette á 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette á 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette á 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette á 4,0 ml. En behandling forebygger nye loppe- og flåtangreb i 3-4 uger. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger bør ikke behandles.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer. **Bivirkninger:** I sjældne tilfælde kan ses hudreaktioner, såsom kløe, rødme og hårtab på applikationsstedet samt sløvhed. **Drægtighed og diegivning:** Kan anvendes under drægtighed og laktation. **Forsigtighedsregler:** Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. **Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet:** Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brug. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat. Hvis præparatet kommer i øjnene ved uheld, skylles de grundigt med vand. Sag straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- og øjenirritationer vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. **Andre informationer:** Opløsningsmidlet i Bayvantic® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

**Pakninger:** Bayvantic® vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml. Marts 2007. **Udl. Tlf. 4523 5000 • Fax 4523 5257**

Må ikke bruges til katte



Bayer HealthCare

Animal Health

Bayer Norden · Animal Health  
Nørgaardsvej 32 · DK-2800 Kgs. Lyngby  
Telefon: 45 23 50 00 · www.bayer.dk

la familia



# FORSVARER DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG



DK0703P40

# BAYVANTIC® VET. HOLDER FLÅTER, LOPPER OG MYG PÅ AFSTAND AF DIN HUND

## BAYVANTIC® VET. BESKYTTER DIN HUND MOD:



### Flåter

Flåter kan overføre sygdomme såsom Borreliose, Babesiose og Ehrlichiose til såvel hunde som mennesker.



### Lopper

Lopper er meget generende, og deres kløende bid er årsag til loppeallergi. Desuden kan de overføre bænelorm og bakterielle infektioner til hunden.



### Myg

Ligesom myg og fluer kan genere mennesker, kan de også være generende for hunde. Visse steder i udlandet kan de også overføre farlige sygdomme.



### Sandfluer

Sandfluer kan overføre alvorlige sygdomme til hunde og er udbredt især i Sydeuropa. Så husk at behandle med Bayvantic®, før du rejser til udlandet.



### Staldfluer

Staldfluer kan være til stor gene for din hund. Bayvantic's® afskrækkende effekt forhindrer bid fra staldfluer.



### Omgivelser

Lopper i omgivelserne (f.eks. i hundekurven, tæpper m.m.) kan udvikle sig til nye generationer af generende og irriterende lopper.

Sammenlign produkterne på markedet og spørg din dyrlæge, dyrehandler eller dit apotek til råds.



Med en pipette Bayvantic® Vet. i nakken én gang om måneden, er din hund rustet mod hele 6 forskellige slags parasitter: lopper, loppelarver, flåter, myg, sandfluer og staldfluer.

Bayvantic® Vet. har en dobbeltvirkende effekt, idet Bayvantic® Vet. ikke kun dræber, men også afskrækker parasitter.

Bayvantic® Vet. holder blodsugende parasitter på afstand og beskytter dermed din hund i op til 4 uger mod smertefulde og kløende parasitbid.

- Bayvantic® Vet. afskrækker og dræber **flåter**.
- Bayvantic® Vet. dræber **lopper** og **loppelarver**.
- Bayvantic® Vet. afskrækker **myg**, **sandfluer** og **staldfluer**.
- Bayvantic® Vet. dræber voksne lopper og lopperlaver i **omgivelserne**.
- Bayvantic® Vet. virker også efter en svømmetur.

Læs mere om behandling af utøj på:  
[www.bayvantic.dk](http://www.bayvantic.dk)



**bayvantic®**